355047 г. Ставрополь
ул. Октябрьская 182-а

УЗИ

Пациент [redacted], номер мед.карты 76790 А, возраст 58 (23.07.1959), гражданские лица, адрес проживания: РОССИЯ, Ставропольский край, Ставрополь г, Ленина ул, д. 484, корп. а, кв. 115

Дата проведения 23.01.2018

ПЕЧЕНЬ. Печень в размерах увеличена за счёт обеих долей, толщина правой доли 14,8 см, толщина левой доли 12 см. Контур печени ровный, чёткий, нижний край несколько закруглён. Эхогенность паренхимы диффузно неоднородная, в целом повышена. Эхоструктура зернистая. Звукопроводимость паренхимы несколько ослаблена, рисунок сосудистых структур обычный. Внутрипеченочные желчные протоки не расширены. На участках доступных визуализации очаговых образований не выявлено. Просвет портальной вены 12 мм (N до 14 мм). Ворота печени от лимфатических узлов свободны.
ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ сокращён, что затрудняет его исследование, полость не определяется, в его проекции визуализируется конкремент с плотной акустической тенью.
Просвет холедоха 4 мм (N до 4-10 мм).Холедох 4мм.
СЕЛЕЗЁНКА. Селезенка в размерах не увеличена, эхогенность обычная. Просвет селезеночной вены в воротах 5 мм. Ворота селезенки от лимфатических узлов свободны.
ПЖЖ. Поджелудочная железа в полном объёме не визуализируется. Поджелудочная железа в размерах не увеличена, контуры зазубренные, нечёткие, эхогенность диффузно высокая, структура среднезернистая, однородная. Просвет вирсунгова протока не расширен.
ПОЧКИ. Почки в размерах: не увеличены. Паренхима почек толщиной до 16-18 мм (N 15-20 мм), эхогенность её обычная. Эхоструктура паренхимы с чёткой кортико-медулярной дифференцировкой. Чашечно-лоханочная система почек не расширена. Эхогенность центральных эхокомплексов повышенная. В на граннице верхнего и среднего сегментов правой почки визуализируется однородное, анэхогенное образование размерами 3,7 х 2,4 см, контуры ровные, чёткие, образование расположено субкапсулярно. В режиме ЭД и ЦДК аваскулярное.
ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА. Лимфатические узлы забрюшинного пространства, тазовые в проекции парааортальной, паракавальной, подвздошных областей на участках доступных визуализации не увеличены.
МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ (трансабдоминальный доступ). Мочевой пузырь правильной формы. Стенки толщиной до 4 мм (N до 5 мм), внутренний контур чёткий ровный, эхогенность стенок однородная, в полости акустически прозрачное содержимое. Исходный объём 593 мл, после мочеиспускания остаточной мочи не обнаружено.
ПРОСТАТА (трансабдоминальный доступ). Простата симметричная, размерами: длина 4 см (N 2,5-3,5 см), поперечный 3,75 см (N 2,7-4 см), передне-задний 3 см (N 1,8-2,5 см), объём 23.4 см куб., контуры чёткие, неровные, эхогенность диффузно неоднородная, в целом повышена, мочевой пузырь не деформирует.
ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА. Щитовидная железа расположена типично, симметричная.
Объём железы 14,7 см куб (N муж. 7,7-25 см куб., N жен. 4,4-18 см куб.). Размеры железы в пределах нормы. Контуры долей чёткие, эхогенность железы диффузно умеренно повышенная.
В среднем сегменте обеих долей визуализируются равномерно неоднородное гипоэхогенное справа размерами 1,82 х 1,18 х 1,23 мм и равномерно неоднородное умеренно гиперэхогенное образование размерами 1,23 х 1,05 х 1,2мм слева, контуры ровные чёткие, окружено тонким гипоэхогенным ободком (halo sing) прослеживающимся по всему периметру, образование не деформирует контуры железы, за образованием акустических эффектов не определяется. В режиме ЭД и ЦДК перинодулярный тип васкуляризации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Гепатомегалия. Признаки жирового гепатоза.
Признаки хронического панкреатита.
Субкапсулярная киста правой почки.
Признаки хронического простатита.
Узловой зоб.

Зав.отд. ультразвуковой диагностики - врач УД

Черномазова И.В.