

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Рома

**Возраст:** 41

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 29.07.2009 16:20:44

**формирования заключения врача:** 29.07.2009 16:25:13

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/101015/answer/101016>



## Заключение врача

Уважаемый Рома! После удаления одной почки вторая почка берет на себя функцию удаленной. При этом она претерпевает значительные изменения, увеличивается в размерах – это так называемая, викарная гипертрофия. Ребенок в таких случаях находится под контролем уролога, ему периодически проводят обследования (общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови, УЗИ почек). Водный режим обычно сохраняется обычный. Диета рекомендуется с исключением острых, пряных, соленых блюд. Периодически необходимо принимать отвары мочегонных трав (кукурузные рыльца, толокнянка, лист брусники, хвощ полевой, березовые почки), избегать переохлаждения, подъема тяжестей, простудных заболеваний. Группа инвалидности присваивается, если есть признаки почечной недостаточности, переосвидетельствование происходит каждый год. Удачи.