

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: -

Возраст: 0

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 20.07.2009 16:47:00

формирования заключения врача: 20.07.2009 20:30:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/101256/answer/101257>



Заключение врача

Уважаемый Денис!

1. Наверное, не простатит, а эпидидимит (воспаление придатка яичка).
2. Спермограмму можно сдать через 1 месяц после лечения.
3. Для ИКСИ достаточно единичных сперматозоидов, полученных или из эякулята, или при биопсии яичка.
4. НО: Если у Вас отсутствуют сперматозоиды в эякуляте - требуется дифференцировать два состояния - нарушение проходимости семявыносящих путей и нарушение функции яичка. Для этого сначала надо сдать кровь на гормоны (ФСГ, ЛГ, пролактин, тестостерон) - как самый неинвазивный метод, и выполнить биопсию яичка (пункционную или открытую). В зависимости от результатов можно будет делать прогнозы насчет зачатия. Если при биопсии будут получены хотя бы единичные сперматозоиды, то их можно использовать для ИКСИ (и даже криоконсервировать для последующих циклов). Если сперматозоидов не будет - то прогноз в отношении беременностей неблагоприятный.

Удачи.