

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** -

**Возраст:** 0

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 27.07.2009 19:54:00

**формирования заключения врача:** 28.07.2009 08:02:00

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/101662/answer/101663>



## Заключение врача

Уважаемая Людмила!

1. В Вашем случае не выяснена причина двустороннего расширения лоханок почек - врожденный гидронефроз, пузырно-мочеточниковый рефлюкс, стриктура лоханочно-мочеточникового сегмента, добавочный сосуд и т.д.
2. . Если есть расширение лоханок, то будет существовать и вторичный хронический пиелонефрит (вследствие заброса мочи), который может приводит к сморщиванию почки, развитию хронической почечной недостаточности, т. е. постепенному снижению функции почки. Ваши врачи выбрали тактику наблюдения, что пока оправданно. Если на контрольном осмотре расширение останется, то необходимо выполнить экскреторную урографию с микционной цистографией.
3. Пройти самостоятельно пиелэктазия может, но не во всех случаях. Опять же, смотря какая ее причина.
4. Если нет активного воспалительного процесса в почках, то прививки не противопоказаны.

Удачи.