

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: -

Возраст: 0

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 28.07.2009 19:59:00

формирования заключения врача: 28.07.2009 20:45:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/101752/answer/101753>



Заключение врача

Уважаемая Мила!

1. Размеры чашечек и лоханок 4 мм - это невыраженное расширение, но это не означает, что проблему можно оставить без внимания.
2. Причину расширения ЧЛС почки по УЗИ установить нельзя. Для этого надо выполнить экскреторную урографию с микционной цистоуретрографией. Только на основании этого вида исследования можно сказать ЧТО является причиной пиелокаликоектазии - врожденный гидронефроз, пузырно-мочеточниковый рефлюкс, стриктура лоханочно-мочеточникового сегмента, добавочный сосуд и т.д.
3. В данной ситуации, если нет активного воспалительного процесса в почке, показано только наблюдение - УЗИ почек 1 раз в 3 месяца, общий анализ мочи, крови, посев мочи на флору, кровь на креатинин и мочевины.
4. Лечение зависит от причины расширения ЧЛС, функции почек, наличия или отсутствия воспалительного процесса в почках.

Удачи.