

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** -

**Возраст:** 0

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 02.08.2009 16:08:00

**формирования заключения врача:** 02.08.2009 17:04:00

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/102239/answer/102240>



## Заключение врача

Уважаемая Татьяна! "Рассосаться" яичко не может. Вы не уточняете, какую операцию делали Вашему сыну. Если яичко не обнаружено при лапароскопической операции, то, вероятнее всего, речь идет о его врожденном отсутствии - монорхизм. Если второе яичко здоровое, то вероятность сохранения репродуктивной функции высока.

Гипоспадия - врожденное недоразвитие, аномалия мочеиспускательного канала. Имеет значение вид гипоспадии - головчатая, венечная, стволовая, мошоночная и промежностная. Чем дальше располагается наружное отверстие мочеиспускательного канала от его нормального места расположения (на головке полового члена), тем тяжелее форма гипоспадии. Оптимально надо прооперировать ребенка до 2х-летнего возраста.

Удачи.