

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Ольга

Возраст: 21

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 27.11.2003 12:00:00

формирования заключения врача: 27.11.2003 12:00:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/1024/answer/1025>



Заключение врача

Уважаемая Ольга! Ваша проблема не так уж и неразрешима. Действительно, хронический шеечный цистит – это длительно и упорно протекающее заболевание, которое требует тщательного лечения. При лечении урогенитальной инфекции, в том числе уреаплазмы нужно придерживаться некоторых принципов: лечение должны проходить оба половых партнера, во время лечения и до сдачи контрольного анализа необходимо воздерживаться от половой жизни (даже презерватив не дает 100% гарантии), проводить иммуностимулирующую и общеукрепляющую терапию. После проведения курса антибактериальной терапии для местного лечения цистита можно делать инстилляции (внутрипузырное введение лекарственных веществ), физиопроцедуры. Если имеется реакция печени и желудка на антибактериальные препараты, то целесообразно следующий курс антибиотикотерапии проводить под прикрытием гепатопротекторов (карсил, эссенциале). Уреплазма, к сожалению, ничем, кроме антибиотиков не лечится, кроме того, она сильно влияет на репродуктивную функцию и поддерживает длительное течение хронического шеечного цистита, поэтому лечиться все-таки обязательно. Настоятельно рекомендую все лечение проводить только под контролем уролога. Если будут ещё вопросы, пишите, буду рад помочь.