

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Светлана

Возраст: 19

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 27.06.2005 21:38:06

формирования заключения врача: 28.06.2005 20:16:04

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/10282/answer/10283>



Заключение врача

Уважаемая Светлана! Рефлюкс может быть прекращен при инъекционном введении различных веществ глубоко в мочеточник, что позволяет создать интрамуральный туннель. Эта методика получила название «СТИНГ» (субтригональная инъекция), вероятнее всего, ее имел в виду Ваш уролог. Ранее для выполнения использовали пасту Политеф. Это вещество представляет собой суспензию пиролизированных тефлоновых частиц в глицерине. В настоящее время применение тефлона при подобных вмешательствах ограничено из-за осложнений. Узнайте какое вещество будут применять в Вашем случае. Результаты СТИНГ несколько хуже по сравнению с открытой хирургической операцией. Примерно у 70% пациентов удается добиться прекращения рефлюкса после первого вмешательства. Однако, после повторных СТИНГ доля вылеченных пациентов высока и составляет 90-95%. С уважением.