

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: -

Возраст: 0

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 11.08.2009 00:11:00

формирования заключения врача: 11.08.2009 06:19:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/103575/answer/103576>



Заключение врача

Уважаемая Юлия! Все зависит от вида крипторхизма (паховый, брюшной).

1. Необходимо наблюдение детского уролога - осмотр 1 раз в 3 месяца с целью уточнения локализации яичка, УЗИ мошонки и пахового промежутка со стороны отсутствующего яичка - 1 раз в 3 месяца.
2. Если не опустится до года - оперативное лечение до 2х-летнего возраста.
3. Если локализация яичка не будет уточнена до года - то показана диагностическая лапароскопия, во время которой будет установлено - есть яичко или нет, т. е. проведена ревизия. Если яичко будет найдено, то оценивается его состояние и состояние сосудистого пучка. Может быть выполнено пересечение короткого сосудистого пучка, чтобы его удлинить. Потом, вторым этапом - уже низведение яичка в мошонку.

Удачи.