

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** -

**Возраст:** 0

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 12.08.2009 19:24:00

**формирования заключения врача:** 13.08.2009 14:50:00

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/103681/answer/103682>



## Заключение врача

Уважаемый Михаил!

1. Ситуация стандартная - инфекция может выявляться только у одного из супругов. Но лечить надо обоих.
2. Самый информативный метод - соскоб из уретры методом ПЦР-диагностики. Точность 96-97%.
3. Уреаплазма передается половым путем и является возбудителем воспалительных заболеваний мочеполовых органов и у женщин, и у мужчин. У женщин при воспалительных заболеваниях гениталий уреаплазмы часто обнаруживаются во влагалище и шейке матки, может служить причиной бесплодия и выкидышей (обнаружили уреаплазмы в амниотической жидкости). У женщин развивается бесплодие вследствие выраженных склеротических изменений фаллопиевых труб вплоть до их обтурации, деструкции эпителия, нарушение внутриорганного кровообращения.
4. Поэтому зачатие пока придется отложить и заняться лечением уреаплазм.

С уважением.