

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Татьяна

**Возраст:** 19

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 08.07.2005 23:32:05

**формирования заключения врача:** 10.07.2005 20:48:49

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/10490/answer/10491>



## Заключение врача

Уважаемая Татьяна! Во время беременности на почки возлагаются дополнительные нагрузки. Это связано с внутриутробным развитием ребенка, с усилением обменных процессов в организме матери. К моменту беременности почки должны быть в максимально здоровом состоянии, т. к. при беременности существует ряд физиологических изменений, которые не самым лучшим образом влияют на организмы матери и ребенка. Дело в том, что гормоны, продуцируемые в период беременности, вызывают расширение и снижение тонуса (атонию) мочеточников; позже беременная матка растет, отклоняется немного вправо, сдавливая правый мочеточник. Все это ведет к нарушению оттока мочи, активизации патогенной флоры, и, соответственно, повышению уровня артериальной гипертензии, что имеет самые неблагоприятные последствия для матери и ребенка. Соответственно, если почки были больны до беременности, то здоровее они не станут, наоборот хронически протекающая инфекция может обостриться, перейти в активную фазу и потребовать срочных мер, как это произошло у Вас. Но тут встает множество ограничений, обусловленных наличием плода - нельзя применять ряд высокоэффективных препаратов, так как они вредны для развивающегося ребенка, нельзя выполнить различные диагностические и лечебные процедуры. Вам необходимо сдать общий анализ мочи катетером, анализ мочи по Нечипоренко и посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам, повторить УЗИ почек. Срочно обратитесь к урологу по месту жительства, Вас необходимо госпитализировать и провести серьезное обследование и лечение в стационарных условиях. Пишите, если будут еще вопросы.