

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Нина

Возраст: 19

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 12.07.2005 17:24:05

формирования заключения врача: 13.07.2005 20:19:36

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/10566/answer/10567>



Заключение врача

Уважаемая Нина! Часто у женщин после родов (или в силу каких-то иных причин) возникает слабость мышц тазового дна, и к существующему у большинства женщин циститу присоединяется уже органический компонент - вероятнее всего, цистоцеле (это опущение мочевого пузыря, или еще это называется опущением передней стенки влагалища, но в данном случае подчеркивается заинтересованность в процессе мочевыводящей системы). Цистоцеле может сопровождаться стрессовой инконтиненцией (недержанием) мочи, связанным с родовой травмой мышц таза и мочевого пузыря. Как правило, в такой ситуации какие-либо консервативные методы лечения (травы, таблетки и т. д.) малоэффективны. Необходимость операции в Вашем случае невозможно определить заочно, все зависит от симптоматики, которая сопровождает Ваше заболевание. Карункулы мочеиспускательного канала - это разновидность полипов уретры. Возникновению карункулов способствуют венозный застой и хроническое воспаление. Основными симптомами карункулов являются выделение крови, боли при ходьбе, мочеиспускании, половом акте, в некоторых случаях затруднение мочеиспускания. Лечение карункулов - хирургическое - иссечение карункула. Прогноз благоприятный. С уважением.