

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Наталья

**Возраст:** 21

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 17.08.2003 12:00:00

**формирования заключения врача:** 17.08.2003 12:00:00

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/106/answer/107>



## Заключение врача

Уважаемая Наталья! Шеечный цистит - это головная боль каждого уролога и людей, страдающих этим заболеванием. Лечение обязательно включает антибиотики, уросептики, иммунные препараты и различные дополнительные процедуры. Антибиотики назначаются в соответствии с результатами посевов на флору и чувствительность к антибиотикам. Если нет возможности сделать эти обследования, то антибиотики назначаются эмпирически (традиционные при урологических заболеваниях). Иммунные препараты назначаются для повышения резистентности (устойчивости) организма, т.к. шеечный цистит - это заболевание, протекающее очень длительно, и резервы организма постепенно исчерпываются. Учитывая у Вас в анамнезе наличие бактериального вагиноза, Вам необходимо тщательное обследование на урогенитальную инфекцию, а лечение надо проходить совместно у уролога и гинеколога. В своей работе для лечения шеечного цистита я пользуюсь следующей схемой:

- с 1 по 10 день - Тимоген 1 амп. (1 мл) в/м 1 раз в день - иммунный препарат
- с 1 по 10 день - Уросептик, как правило, фторхинолон (ципрофлоксацин 250 мг 3 раза в день или пefлоксацин 400 мг 2 р/д.)
- с 1 по 10 день - Метронидазол 500 мг 3 раза в день
- с 1 по 10 день - Свечи с красавкой 1 свеча на ночь в задний проход.
- с 11 по 20 день - Ежедневно инстилляции с протарголом 2-3% 20-30 мл, можно чередовать с тампонадой шейки мочевого пузыря ауробином.
- с 11 по 30 день - Имунал по 15 кап. 3 раза в день после еды
- с 11 по 25 день - Нитроксолин по 2 таб. 3 раза в день.
- с 11 по 20 день - Физиопроцедуры - амплипульс на область мочевого пузыря

Дальнейшее лечение зависит от результатов предыдущего курса, поэтому необходимо постоянное наблюдение уролога, для возможной коррекции лечения и правильной оценки результатов. Поэтому настоятельно рекомендуем проводить лечение не у виртуального уролога, а у Вашего уролога по месту жительства.