

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Виталий

Возраст: 40

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 15.09.2009 01:56:00

формирования заключения врача: 15.09.2009 05:47:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/108176/answer/108177>



Заключение врача

Уважаемый Виталий! Как можно избавиться:

1. Первая линия терапии - Вы уже перечислили - различные поведенческие техники, анестезирующие гели и мази и т.д.
2. Пероральная терапия - используются специальные препараты. Все препараты назначаемой группы обладают целым рядом серьезных, и даже опасных, побочных эффектов, поэтому они назначаются только после осмотра пациента, некоторых обследований, отсутствии сопутствующей патологии и только на очном приеме. Сначала они назначаются в тестовом режиме, в малых дозировках, потом, если все нормально, в терапевтических дозах. Но пациент постоянно находится под наблюдением.
3. Хирургическое лечение - выполняется селективная резекция боковых ветвей дорзального нерва, или старый метод - обрезание крайней плоти.
4. Причина Вашей проблемы определяется на очном приеме уролога.

Удачи.