

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Владислав

Возраст: 19

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 29.07.2005 23:07:27

формирования заключения врача: 30.07.2005 22:10:29

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/10866/answer/10867>



Заключение врача

Уважаемый Владислав! Весьма трудно ответить на подобный вопрос. Необходимо знать степень структуры, ее протяженность. Консервативное лечение - таблетки, физиопроцедуры - в данном случае неэффективны. Есть инвазивные методики: бужирование уретры, эндоскопические методы лечения, открытые способы пластики уретры и т. д. Бужирование уретры - это весьма болезненная процедура, которая заключается в постепенном введении все больших размеров бужей (металлических трубок) в уретру. Бужирование применяется при стриктурах (сужении) уретры. Частота проведения процедуры - 2-3 раза в неделю в зависимости от степени сужения и тенденции к рецидиву. Но иногда требуется ежедневное проведение бужирования. Если стриктура выражена сильно, если сужения мочеиспускательного канала множественные, имеют большую протяженность и если нет эффекта от бужирования, то тогда необходимо оперативное лечение.