

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Ольга

Возраст: 52

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 23.09.2009 19:40:00

формирования заключения врача: 23.09.2009 20:24:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/109117/answer/109118>



Заключение врача

Уважаемая Ольга! Вероятнее всего, у Вас имеет место [стрессовое недержание мочи](#), при котором Дриптан неэффективен. Чтобы уточнить причину, надо осмотреть Вас на кресле, выполнить некоторые функциональные пробы и КУДИ - комплексное уродинамическое исследование. В такой ситуации какие-либо консервативные методы лечения малоэффективны. На сегодняшний день хорошо зарекомендовавшим себя способом оперативного лечения недержания мочи является субуретральный слинг. Это ряд операций, смысл которых заключается в подвешивании уретры в виде гамака специальными синтетическими полосками (пропилен). Это TVT, TOT, IVS и др. Такие операции выполняются практически в амбулаторных условиях (в разных клиниках по-разному). Удачи.