

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** татьяна

**Возраст:** 19

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 04.08.2005 01:20:58

**формирования заключения врача:** 08.08.2005 16:44:35

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/10926/answer/10927>



## Заключение врача

Уважаемая Татьяна! К сожалению, на однократной консультации невозможно все узнать. Вашей девочке необходимо сделать контрольные анализы – общий анализ мочи, анализ мочи по Нечипоренко, биохимический анализ крови (креатинин, мочевины, остаточный азот, глюкоза, общий белок), УЗИ (почек, мочевого пузыря с определением количества остаточной мочи), экскреторная урография (рентгенисследование почек с контрастным препаратом), консультация эндокринолога (на предмет сахарного диабета). Неполное удвоение почки – это достаточно часто встречающаяся аномалия развития мочевыводящей системы. Неравномерное мочеиспускание иногда наблюдается не только у детей, зависит от водного режима и поведения (активное, двигательное и т. д.). Запах мочи зависит от инфекции (но у Вас посев мочи отрицательный), от уровня сахара в крови, и т. д. Что касается колебаний белка и лейкоцитов в моче – то насколько они диагностически значимы? Обязательно проконсультируйте ребенка еще раз у нефролога и эндокринолога. С уважением.