

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: сергей
Возраст: 19
Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич
Специализация: Уролог
Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 08.08.2005 18:04:27
формирования заключения врача: 10.08.2005 20:29:40

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/10970/answer/10971>



Заключение врача

Уважаемый Сергей! Причиной ускоренного семяизвержения является уменьшение порога возбудимости оргастического центра. Преждевременная эякуляция может быть симптомом некоторых урологических заболеваний: воспаление предстательной железы (простатит), воспаление задней уретры и семенного бугорка, воспаление семенных пузырьков и т. д. Также преждевременная эякуляция может встречаться при сильном половом влечении, при сильной половой конституции, после длительного воздержания. В этом случае можно рекомендовать ведение регулярной половой жизни с постоянным партнером, использование мазей, пролонгирующих (удлиняющих) половой акт. Это любые мази, содержащие анестетики. Какие горячие ванны Вы имеете в виду? Из пищи необходимо исключить острые, сильно соленые блюда, алкоголь. Дизритмии (нарушения ритма и регулярности) половой жизни отрицательно сказываются на функции мужских репродуктивных органов, т.к. вызывают конгестивные (застойные) заболевания органов малого таза. Удачи!