

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Сергей

Возраст: 19

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 15.08.2005 03:39:22

формирования заключения врача: 15.08.2005 23:09:17

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/11040/answer/11041>



Заключение врача

Уважаемый Сергей! Вероятнее всего, у Вас имеет место фимоз (врожденный порок развития полового члена) – сужение крайней плоти, в результате чего головка полового члена не выводится. При фимозе внутри препуциального мешка скапливается беловатое сальное вещество (сmegма), продуцируемое железами, расположенными на головке полового члена. Смegма может сгущаться, инкрустироваться солями, а при присоединении инфекции - разлагаться, вызывая воспаление головки и крайней плоти полового члена (баланопостит), что в дальнейшем может привести к развитию рака. Настоятельно рекомендую не злоупотреблять самостоятельным оголением головки полового члена, т.к. может наступить грозное осложнение - парафимоз (ущемление головки полового члена), когда в силу каких-то причин Вы не сможете вправить головку в её первоначальное состояние, и тогда потребуются экстренная хирургическая помощь и операция. Также фимоз будет мешать Вам вести нормальную половую жизнь. Поэтому целесообразно сделать операцию циркумцизию (обрезание крайней плоти), она не является сложной и выполнить её могут в любом урологическом отделении муниципальной больницы (бесплатно), либо в частной клинике (цены очень варьируют). Если будут еще вопросы – пишите.