

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Андрей

Возраст: 19

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 22.08.2005 15:45:48

формирования заключения врача: 24.08.2005 20:13:03

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/11140/answer/11141>



Заключение врача

Уважаемый Андрей! Вероятнее всего, у Вас имеет место фимоз - врожденный порок развития полового члена (сужение крайней плоти, препятствующее обнажению головки полового члена). При фимозе внутри препуциального мешка скапливается беловатое сальное вещество (сmegма), продуцируемое железами, расположенными на головке полового члена. Смegма может сгущаться, инкрустироваться солями, а при присоединении инфекции - разлагаться, вызывая воспаление головки и крайней плоти полового члена (баланопостит), что в дальнейшем может привести к развитию рака. Настоятельно рекомендую не злоупотреблять самостоятельным оголением головки полового члена, т.к. может наступить грозное осложнение - парафимоз (ущемление головки полового члена), когда в силу каких-то причин Вы не сможете вправить головку в её первоначальное состояние, и тогда потребуются экстренная хирургическая помощь и операция. Также фимоз будет мешать Вам вести нормальную половую жизнь. Поэтому целесообразно сделать операцию циркумцизию (обрезание крайней плоти), она не является сложной, и выполнить её могут в любом урологическом отделении муниципальной больницы (бесплатно), либо в частной клинике (цены очень варьируют). Удачи!