

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Андрей, 22 года

Возраст: 19

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 22.08.2005 17:38:31

формирования заключения врача: 24.08.2005 20:13:27

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/11144/answer/11145>



Заключение врача

Уважаемый Андрей! Преждевременная эякуляция может встречаться при сильном половом влечении, при сильной половой конституции, после длительного воздержания. В этом случае можно рекомендовать ведение регулярной половой жизни с постоянным партнером, использование мазей, пролонгирующих (удлиняющих) половой акт. Это любые мази, содержащие анестетики. Что касается уздечки, то вероятнее всего, у Вас имеет место короткая уздечка. Проблема заключается в том, что при половом акте короткая уздечка может надрываться. Чаще всего надрыв происходит при короткой уздечке, при слишком бурном половом акте. Обычно при разрыве уздечки надрыв заживает сам. Но в некоторых случаях заживает не совсем удачно, требует дополнительное медицинское вмешательство. При этом можно сделать операцию циркумцизию (обрезание), или пластику уздечки. Второй метод заключается в том, что уздечку иссекают в поперечном направлении, а сшивают в продольном. Сделать это можно в любом урологическом отделении, по времени операция занимает до 15 минут. А пока, чтобы убрать неприятные явления, можно поделаться ванночки с перманганатом калия (марганцовка - слабо-розовый раствор) 3-4 раза в день, после чего смазывать место повреждения мазью АУРОБИН. Она содержит антибиотик, противовоспалительное и обезболивающее средство. До полного заживления не рекомендуется жить половой жизнью. Если у Вас остались вопросы, пишите, буду рад помочь. Удачи!