

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Андрей

Возраст: 47

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 11.10.2009 23:38:00

формирования заключения врача: 12.10.2009 07:27:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/111804/answer/111805>



Заключение врача

Уважаемый Андрей! Это называется [варикоцеле](#) – варикозное расширение вен гроздьевидного сплетения. Как правило, наблюдается у детей старше 10-летнего возраста, а наибольшая частота варикоцеле приходится на 14-15 возраст. Варикоцеле - результат обратного тока крови, направленного по яичковой вене из почечной в гроздьевидное сплетение. Это происходит в результате врожденного отсутствия клапанов в яичковой вене, или при развитии гипертензии в венозной системе почки при стенозе (сужении) почечной вены. Тяжесть состояния определяет не выраженность варикозного расширения вен семенного канатика, а наступающие нарушения сперматогенеза (рост и созревание сперматозоидов). Среди различных причин мужского бесплодия на долю варикоцеле приходится 39%. С течением времени (без лечения) происходит изменение консистенции и размеров яичка вплоть до его гипотрофии и атрофии (как в Вашем случае). Консервативных методов лечения варикоцеле не существует, это заболевание лечится исключительно оперативным способом. Вам надо обратиться к урологу для решения вопроса об оперативном лечении. Удачи.