

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Валентин

Возраст: 19

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 26.08.2005 17:54:27

формирования заключения врача: 27.08.2005 22:15:48

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/11206/answer/11207>



Заключение врача

Уважаемый Валентин! Уреаплазмы передаются половым путем (при любых формах половых контактов, причем вполне достаточно одного контакта) и являются возбудителями воспалительных заболеваний мочеполовых органов и у женщин, и у мужчин. У женщин при воспалительных заболеваниях гениталий уреаплазмы часто обнаруживаются во влагалище и шейке матки, может служить причиной бесплодия (это достоверно доказано) и выкидышей (обнаружили уреаплазмы в амниотической жидкости). У женщин развивается бесплодие вследствие выраженных склеротических изменений фаллопиевых труб вплоть до их обтурации, деструкции эпителия, нарушение внутриоргана кровообращения. У мужчин уреаплазмы и микоплазмы вызывают воспалительные заболевания предстательной железы, семенных пузырьков, мочевого пузыря. Лечение назначается ОДНОВРЕМЕННО обоим партнерам, причем во время лечения и до получения отрицательного контрольного результата не рекомендуется жить половой жизнью. Презерватив не дает 100% гарантии. Удачи!