

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Татьяна

Возраст: 19

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 29.08.2005 09:33:30

формирования заключения врача: 29.08.2005 23:16:09

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/11236/answer/11237>



Заключение врача

Уважаемая Татьяна! Имеющиеся у Вас герпетическая и цитомегаловирусная инфекции, а также кандидоз (в народе - «молочница») - достаточные причины для сохранения дизурических явлений, жжения. Уреаплазмы, микоплазмы также могут быть причиной длительно протекающих воспалительных процессов в мочевом пузыре. Анализ мочи по Нечипоренко - норма. Посев мочи на флору выявил наличие в моче кишечной палочки, правда, в небольшой концентрации, но в норме ее не должно быть вообще. Она в 80% является возбудителем воспалительных процессов в органах мочевыводящей системы (по данным наших и зарубежных авторов). Так что для существования жжения у Вас, Татьяна, причин много. Нолицин можно заменить ципрофлоксацином, офлоксацином и др. фторхинолонами. Конечно, лечение Вы должны проводить только под контролем своего уролога, я могу только что-то рекомендовать, посоветовать. Соблюдайте диету (исключите острое, соленое, алкоголь, газированные напитки), пейте больше жидкости (чай, соки, компоты), отвары мочегонных трав (кукурузные рыльца, толокнянка, лист и ягоды брусники, клюквы). После приема антибиотиков надо будет принимать эубиотики (препараты, восстанавливающие нормальную микрофлору организма) - линекс, или бифидумбактерин, или бификол, или другие препараты этой группы. Пишите, буду рад помочь.