

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Маша

Возраст: 19

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 17.09.2005 15:23:17

формирования заключения врача: 17.09.2005 21:07:31

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/11540/answer/11541>



Заключение врача

Уважаемая Маша! Ответ тот же. От неграмотного применения фуросемида ничего хорошего ожидать нельзя. Этот препарат относится к диуретикам (мочегонным препаратам), действующим на уровне петли Генле. Это наиболее эффективный препарат среди всех других мочегонных средств. Мочегонный эффект наступает быстро, но длится кратковременно. В основном, его применяют при гипертонической болезни, хронической недостаточности кровообращения, отеке мозга, отеке легких, других отечных состояний различного генеза, но никак не для снижения веса. Побочные эффекты заключаются в нарушении кислотно-основного равновесия, водно-электролитного обмена. Нарушения центральной нервной системы характеризуются головной болью, бессонницей, сонливостью. Повышается риск развития камней почек, образуются кристаллы в канальцах почек. Желудочно-кишечные нарушения проявляются снижением аппетита, запорами или поносами, тошнотой, болями в животе, развитием острого панкреатита (воспаление поджелудочной железы), холецистита (воспаление желчного пузыря). Самое частое осложнение при бесконтрольном применении фуросемида - снижение уровня калия в крови, что проявляется мышечной слабостью, вплоть до параличей, нарушением сердечной деятельности - аритмией (нарушение ритма), тахикардией (учащение сердечного ритма). Вы принимали очень большое количество фуросемида, а нынешнее Ваше состояние (отеки) обусловлено синдромом отмены, т. е. Ваш организм привык выводить жидкость с посторонней помощью и не может делать это самостоятельно. Снижать дозировку фуросемида в сложившейся ситуации надо очень осторожно, длительно и постепенно. Настоятельно рекомендую делать это под контролем врача (нефролога, терапевта), с обязательным контролем электролитов крови. По поводу влияния фуросемида на течение беременности - вопрос к нефрологам и гинекологам. Удачи!