

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Надежда

**Возраст:** 19

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 17.09.2005 17:03:26

**формирования заключения врача:** 17.09.2005 21:07:44

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/11542/answer/11543>



## Заключение врача

Уважаемая Надежда! Дистопия почек - это аномалия положения почек. Если у Вашей дочери выявлена дистопия, то это означает, что почки расположены в аномальном месте, т. е. там, где по норме их не должно быть. В Вашем случае - поясничной дистопии - почки располагаются низко в поясничной области. Причем, чем ниже располагается дистопированная почка, тем больше отклонений от нормы имеют её форма и строение. Ортостатическая протеинурия - выделение белка с мочой при вертикальном положении тела, в положении лежа протеинурия исчезает. Чаще всего ортостатическая протеинурия возникает у 15% подростков 7-17 лет и 3% здоровых взрослых людей. В утренней моче протеинурия отсутствует, появляется в первые часы после подъема. Ортостатическая протеинурия обычно доброкачественная, почечная недостаточность не развивается. У 50% пациентов она постепенно исчезает. Что касается патологии мочевого пузыря, то необходимо дообследование - урофлоуметрия. Для этого надо обратиться к детскому урологу по месту жительства. С уважением.