

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Андрийчук Андрей Сергеевич

Возраст: 19

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 20.09.2005 12:10:30

формирования заключения врача: 22.09.2005 21:17:37

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/11598/answer/11599>



Заключение врача

Уважаемый Андрей Сергеевич! У многих женщин возникает подобная проблема - обострение хронических заболеваний почек в период беременности. Этому способствуют несколько факторов: большая нагрузка на почки - два организма - мать и ребенок (первая причина); нарушение оттока мочи - беременная матка сдавливает мочеточники (вторая причина), от этого происходит застой мочи в верхних мочевых путях и при наличии инфекции (третья причина) создаются условия для возникновения пиелонефрита беременных. Далее, во время беременности в женском организме содержится повышенный уровень прогестерона (он необходим для сохранения беременности), этот гормон вызывает расслабление стенок мочеточников и их расширение (дилатацию). Это приводит к тому, что снижается тонус мочеточников и происходит нарушение оттока мочи (четвертая причина). Вашей жене можно рекомендовать делать общий анализ крови и общий анализ мочи каждые 2 недели, биохимический анализ крови, соблюдать водный режим, считать водный баланс, следить за артериальным давлением, наблюдаться у уролога. С уважением.