

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** алина

**Возраст:** 40

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 17.11.2009 22:56:00

**формирования заключения врача:** 18.11.2009 11:12:00

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/117662/answer/117663>



## Заключение врача

Уважаемая Алина!

1. При диагностике цистита анализы на ЗППП сдаются методом ПЦР! Антитела не являются показанием для назначения лечения!
2. Также для уточнения диагноза и определения дальнейшей тактики Вам необходимо обследоваться под контролем уролога: сдать общий анализ мочи; посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам; УЗИ (почек, мочевого пузыря с определением количества остаточной мочи).
3. Также нужен осмотр на кресле на предмет диспозиции уретры (слишком низкого ее расположения по отношению к влагалищу, в результате чего выделения из влагалища и области промежности во время полового акта попадают на уретру и потом в мочевой пузырь).
4. Также нужно обследование полового партнера на ЗППП.
5. Возможно, потребуется выполнение цистоскопии.

В зависимости от результатов можно будет назначить правильное лечение. Удачи.