Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Анна

Возраст: 41

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 19.11.2009 02:47:00

формирования заключения врача: 19.11.2009 08:47:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://03uro.ru/consultations/question/117728/answer/117729

Заключение врача

Уважаемая Анна! Ваши врачи абсолютно правы. При нефроптозе оперативное лечение проводится только в случаях, когда есть осложнения нефроптоза - гематурия, высокое некоррегируемое артериальное давление, частые атаки пиелонефрита (не по данным УЗИ и урографии, а по посеву мочи на флору, клиническим признакам, повышенной температуре), мочекаменная болезнь, нарушение оттока мочи из почки - гидронефрозе, болевом синдроме. При самом факте наличия нефроптоза без указанных признаков оперативное лечение не целесообразно. Во время беременности состояние пациенто с нефроптозом, как правило, улучшается. Но всю беременность надо находится под контролем уролога. Удачи.