

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Андрей

**Возраст:** 19

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 03.10.2005 06:00:32

**формирования заключения врача:** 03.10.2005 20:50:08

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/11874/answer/11875>



## Заключение врача

Уважаемый Андрей! Нарушение мочеиспускания, рези в уретре, гематурия (кровь в моче), появившиеся после полового контакта, могут говорить об инфекции мочевыводящих путей, передающейся половым путем. В этом случае секс мог быть причиной воспалительного процесса. При воспалительном процессе в предстательной железе половые контакты не запрещены, а наоборот, они способствуют оттоку секрета простаты, предотвращают конгестивный компонент. Для уточнения диагноза и определения дальнейшей тактики Вам необходимо тщательно обследоваться под контролем уролога: на урогенитальную инфекцию - хламидии, трихомонады, гарднереллы, микоплазмы, кандиды, уреаплазмы; сдать общий анализ мочи, посев секрета простаты на флору и чувствительность к антибиотикам, секрет простаты, УЗИ (или ТРУЗИ) мочевого пузыря и предстательной железы. После этого можно будет определиться с дальнейшей тактикой. Удачи!