

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Стас

Возраст: 21

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 09.12.2003 12:00:00

формирования заключения врача: 09.12.2003 12:00:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/1208/answer/1209>



Заключение врача

Уважаемый Стас! Чаще всего такие симптомы наблюдаются при хронических воспалительных процессах в предстательной железе (простатитах), но могут встречаться при гиперрефлекторном мочевом пузыре. Но, учитывая виртуальность консультации, не надо принимать это за догму, а надо обследоваться. Прежде всего, Вам необходимо сдать анализ общий мочи, посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам, сделать УЗИ (почек, мочевого пузыря, предстательной железы, органов мошонки), сдать анализы на урогенитальную инфекцию методом ПЦР-диагностики (хламидии, трихомонады, уреаплазмы, гарднереллы, микоплазмы, кандиды и др.). Нарушение оттока мочи может происходить как из-за слабого позыва (при гиперрефлекторном мочевом пузыре), так и из-за воспалительного отека при воспалении простаты. Если будут вопросы, пишите, буду рад помочь.