

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Галина

**Возраст:** 76

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 20.12.2009 19:10:10

**формирования заключения врача:** 20.12.2009 19:40:49

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/122363/answer/122365>



## Заключение врача

Здравствуйтесь, Галина! Мировая практика свидетельствует, что при впервые возникшей острой задержке мочеиспускания (ОЗМ) больные НЕ НУЖДАЮТСЯ в установке постоянного катетера. Более того, длительно стоящий катетер сам по себе может привести к инфицированию и образованию ранней стриктуры (сужения просвета) уретры. Показана медикаментозная консервативная терапия. В случае повторной ОЗМ на фоне лекарств - проводится операция - троакарная эпицистостомия. Фитолизин показан, но необходимо дополнить рацион антибиотиком. Пережимать катетер не имеет смысла. Рекомендую находиться под наблюдением уролога поликлиники.