

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Александр

Возраст: 19

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 22.10.2005 12:54:25

формирования заключения врача: 24.10.2005 18:13:40

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/12300/answer/12301>



Заключение врача

Уважаемый Александр! Уреаплазмы передаются половым путем и являются возбудителями воспалительных заболеваний мочеполовых органов и у женщин, и у мужчин. У женщин при воспалительных заболеваниях гениталий уреаплазмы часто обнаруживаются во влагалище и шейке матки, может служить причиной бесплодия (это достоверно доказано) и выкидышей (обнаружили уреаплазмы в амниотической жидкости). У женщин развивается бесплодие вследствие выраженных склеротических изменений фаллопиевых труб вплоть до их обтурации, деструкции эпителия, нарушение внутриорганного кровообращения. У мужчин уреаплазмы вызывают воспалительные заболевания предстательной железы, семенных пузырьков, мочевого пузыря. Контактно-бытовой способ передачи инфекции встречается казуистически редко. Другое дело, что уреаплазмы могут передаваться во время беременности и родов - так называемый вертикальный путь заражения, от матери ребенку. Лечение назначается ОДНОВРЕМЕННО обоим партнерам, причем во время лечения и до получения отрицательного контрольного результата не рекомендуется жить половой жизнью. Для назначения лечения Вам необходимо обратиться к урологу по месту жительства. Удачи!