

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Оксана

Возраст: 20

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 10.12.2003 12:00:00

формирования заключения врача: 10.12.2003 12:00:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/1234/answer/1235>



Заключение врача

Уважаемая Оксана! Активизация любого воспалительного процесса может произойти именно в первые месяцы беременности. Предрасполагающим фактором является нарушение гормонального баланса. Эстрогены – женские половые гормоны – приводят к атонии (отсутствие тонуса) мочевых путей, предрасполагают к возникновению воспаления не только в мочевом пузыре, но и в почках. Нарушение оттока мочи вследствие атонии мочевых путей и мочевого пузыря являются условием для активизации патогенной флоры, а, возможно, присутствующий при этом пузырно-мочеточниковый рефлюкс (заброс) способствует проникновению ее (флоры) в почки. Сделайте новый посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам, т. к. золотистый стафилококк не должен в норме присутствовать в моче, он как раз и является патогенным микроорганизмом. После получения результата можно будет определиться с проведением антибактериальной терапией, подобрать такие препараты, которые можно применять при беременности. Присутствующая инфекция в организме гораздо более опасна и для Вас, и для ребенка, чем правильно и грамотно проведенная антибиотикотерапия. Фитолизин не применяется в виде монотерапии (т. е. один) для лечения воспалительных заболеваний. Удачи!