

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Генри

Возраст: 19

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 28.10.2005 14:20:17

формирования заключения врача: 30.10.2005 22:09:21

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/12398/answer/12399>



Заключение врача

Уважаемый Генри! Проблема в вирусах – от них очень трудно избавиться. Кондиломатоз – это вирусное заболевание, передающееся половым путем, а проявляется в связи с ослаблением иммунитета (после переохлаждений, перегреваний, перенесенных простудных заболеваний и т. д.). Поэтому проводят лечение обоих половых партнеров одновременно с применением иммуностимулирующих, противовоспалительных, противовирусных препаратов, а также местное лечение – препаратом КОНДИЛИН. Это очень сильный препарат, подофилотоксин, который при попадании на кондилому вызывает некроз (омертвление) тканей. Следовательно, применять его надо очень осторожно, т. к. при попадании на здоровую кожу он также может вызвать некроз. Нередко одного местного лечения бывает недостаточно, необходимо добавить иммуностимулирующую и общеукрепляющую терапию. Новые рецидивы кондилом говорят о развитии вторичного иммунодефицита. При необходимости имеет смысл взять биопсию подозрительных участков. Для кондиломатоза характерен половой путь передачи инфекции. Заражению способствуют небольшие трещинки (микротравмы) кожи и слизистых оболочек. Контактно-бытовой способ передачи инфекции допускается, но изучен мало и на деле встречается крайне редко. Кондиломы чаще располагаются на влажных участках кожи – преддверие влагалища, задний проход, внутренний листок крайней плоти, тело полового члена, мошонка, большие половые губы, уретра. Удаление кондилом снижает риск заражения половых партнеров. Все обследование и лечение надо проходить ТОЛЬКО под контролем уролога. Выздоровливайте.