

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Antonio

Возраст: 19

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 29.10.2005 07:59:30

формирования заключения врача: 30.10.2005 22:14:49

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/12414/answer/12415>



Заключение врача

Уважаемый Antonio! Рецидив варикоцеле возможен, но это встречается крайне редко. После операции, приблизительно до 2-х месяцев, происходит запустевание вен яичка и семенного канатика. В этот период вены еще не спавшиеся, могут быть видны на УЗИ, пальпироваться, определяться в мошонке. Так как запустевают вены, в мошонке в этот период идет перестройка кровообращения в мошонке, с этим связаны боли, временный дискомфорт в мошонке, заднем проходе, промежности. Также может наблюдаться временное незначительное увеличение яичка в размерах. Но во время операции иногда вместе перевязываются венозные и лимфатические стволы, в результате нарушается отток лимфы от мошонки и её органов. В связи с этим возникает стойкое увеличение яичка, которое, впрочем, сильно не влияет на его функцию. Если же с момента операции прошло больше 2-х месяцев, то можно думать о неполном прекращении патологического венозного тока. Такое встречается при рассыпном (много вен) типе строения яичковой вены. В этом случае обязательно обратитесь к своему оперирующему урологу. В мошонке, кроме яичка, есть еще придаток яичка, семявыносящий проток, яичковая артерия, яичковая вена, лимфатические сосуды, фиброзный тяж. Сделайте УЗИ органов мошонки. Обязательно сходите к урологу по месту жительства для осмотра. Удачи!