

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Antonio

**Возраст:** 19

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 29.10.2005 07:59:30

**формирования заключения врача:** 30.10.2005 22:14:49

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/12414/answer/12415>



## Заключение врача

Уважаемый Antonio! Рецидив варикоцеле возможен, но это встречается крайне редко. После операции, приблизительно до 2-х месяцев, происходит запустевание вен яичка и семенного канатика. В этот период вены еще не спавшиеся, могут быть видны на УЗИ, пальпироваться, определяться в мошонке. Так как запустевают вены, в мошонке в этот период идет перестройка кровообращения в мошонке, с этим связаны боли, временный дискомфорт в мошонке, заднем проходе, промежности. Также может наблюдаться временное незначительное увеличение яичка в размерах. Но во время операции иногда вместе перевязываются венозные и лимфатические стволы, в результате нарушается отток лимфы от мошонки и её органов. В связи с этим возникает стойкое увеличение яичка, которое, впрочем, сильно не влияет на его функцию. Если же с момента операции прошло больше 2-х месяцев, то можно думать о неполном прекращении патологического венозного тока. Такое встречается при рассыпном (много вен) типе строения яичковой вены. В этом случае обязательно обратитесь к своему оперирующему урологу. В мошонке, кроме яичка, есть еще придаток яичка, семявыносящий проток, яичковая артерия, яичковая вена, лимфатические сосуды, фиброзный тяж. Сделайте УЗИ органов мошонки. Обязательно сходите к урологу по месту жительства для осмотра. Удачи!