

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Alex

Возраст: 21

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 11.12.2003 12:00:00

формирования заключения врача: 11.12.2003 12:00:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/1250/answer/1251>



Заключение врача

Уважаемый Alex! Изменение реакции мочи в щелочную сторону вызывают:

- 1 вегетарианская пища
- 2 значительные потери желудочного сока (рвота, промывание желудка)
- 3 всасывание экссудата или трансудата при воспалительных процессах (их реакция щелочная)
- 4 бактериальные воспалительные процессы, циститы
- 5 гематурия (выделение крови с мочой), почечная недостаточность
- 6 злокачественные новообразования органов мочеполовой системы в стадии распада
- 7 хлорид аммония, производные тиазида

«Бороться» с щелочной реакцией мочи не надо. Единственное, что при длительном ее существовании или она существует постоянно, создаются условия для образования камней фосфатов. Чтобы в Вашей ситуации исключить заболевания мочевыводящей системы, Вашему пациенту необходимо сдать (кроме общего анализа мочи) посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам, на урогенитальную инфекцию методом ПЦР-диагностики (хламидии, трихомонады, уреаплазмы, гарднереллы, микоплазмы, кандиды и др.), сделать УЗИ почек, мочевого пузыря. С уважением.