

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Alex

**Возраст:** 20

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 11.12.2003 12:00:00

**формирования заключения врача:** 11.12.2003 12:00:00

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/1250/answer/1251>



## Заключение врача

Уважаемый Alex! Изменение реакции мочи в щелочную сторону вызывают:

- 1 вегетарианская пища
- 2 значительные потери желудочного сока (рвота, промывание желудка)
- 3 всасывание экссудата или трансудата при воспалительных процессах (их реакция щелочная)
- 4 бактериальные воспалительные процессы, циститы
- 5 гематурия (выделение крови с мочой), почечная недостаточность
- 6 злокачественные новообразования органов мочеполовой системы в стадии распада
- 7 хлорид аммония, производные тиазида

«Бороться» с щелочной реакцией мочи не надо. Единственное, что при длительном ее существовании или она существует постоянно, создаются условия для образования камней фосфатов. Чтобы в Вашей ситуации исключить заболевания мочевыводящей системы, Вашему пациенту необходимо сдать (кроме общего анализа мочи) посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам, на урогенитальную инфекцию методом ПЦР-диагностики (хламидии, трихомонады, уреаплазмы, гарднереллы, микоплазмы, кандиды и др.), сделать УЗИ почек, мочевого пузыря. С уважением.