

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Дмитрий 28 лет

**Возраст:** 19

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 18.11.2005 01:54:34

**формирования заключения врача:** 18.11.2005 18:33:32

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/12816/answer/12817>



## Заключение врача

Уважаемый Дмитрий! Вместе с Вами должен был пролечиться Ваш половой партнер (если постоянный). То есть, если Вы вступили вновь в незащищенный половой контакт, то есть вероятность вторичного заражения. Чтобы точно выяснить причину жжения и резей в мочеиспускательном канале, надо повторно обследоваться: на хламидии, трихомонады, кандиды, уреаплазмы, микоплазмы, кандиды, герпес типа 1,2 и сдать посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам. Взгляды по поводу необходимости лечения урогенитальной инфекции остаются открытым, на мой взгляд - лечить надо. Пока не принимайте никаких антибиотиков, обследуйтесь. А когда будет выяснена причина - провести лечение. Удачи!