

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Людмила

**Возраст:** 83

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 29.01.2010 15:07:00

**формирования заключения врача:** 29.01.2010 22:01:00

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/128603/answer/128604>



## Заключение врача

Уважаемая Людмила! В данной ситуации, если по результатам обследований подтвердится отсутствие метастазов (региональных и отдаленных), т. е. опухоль будет носить локальный характер (не выходить за пределы органа), то в таком случае возможно выполнение высокотехнологичных, малоинвазивных, радикальных (излечивающих) методик - [брахитерапии](#), HIFU-терапии. В таком случае прогноз хороший. Третий радикальный метод, который существует - это радикальная простатэктомия (РПЭ) - операция, которую, вероятно, Вам предлагают. Но брахитерапия и [HIFU-терапия](#) имеют ряд преимуществ - отсутствует кровопотеря, через 2-4 дня пациенты уходят домой (при РПЭ - около 2-3х недель), сохраняют потенцию, удерживают мочу. Мы готовы помочь Вам на базе (Москва), все организационные вопросы решите по телефону 8(964)719-97-29. Удачи.