

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Виола

Возраст: 19

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 22.11.2005 23:06:38

формирования заключения врача: 23.11.2005 20:24:39

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/12914/answer/12915>



Заключение врача

Уважаемая Виола! Уреаплазмы передаются половым путем и являются возбудителями воспалительных заболеваний мочеполовых органов и у женщин, и у мужчин. У женщин при воспалительных заболеваниях гениталий уреаплазмы часто обнаруживаются во влагалище и шейке матки, может служить причиной бесплодия (это достоверно доказано) и выкидышей (обнаружили уреаплазмы в амниотической жидкости). У женщин развивается бесплодие вследствие выраженных склеротических изменений фаллопиевых труб вплоть до их обтурации, деструкции эпителия, нарушение внутриорганного кровообращения. У мужчин уреаплазмы и микоплазмы вызывают воспалительные заболевания предстательной железы, семенных пузырьков, мочевого пузыря. Лечение назначается ОДНОВРЕМЕННО обоим партнерам, причем во время лечения и до получения отрицательного контрольного результата не рекомендуется жить половой жизнью. Трудно сказать почему лечение неэффективно. Возможно, не пролечен половой партнер, либо особенности Вашего иммунитета, нечувствительность уреаплазмы к лекарствам и т. д. Эту тему лучше обсудить с Вашим лечащим врачом, не пытайтесь решить проблему самостоятельно. Удачи!