

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Федор

**Возраст:** 20

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 15.12.2003 12:00:00

**формирования заключения врача:** 15.12.2003 12:00:00

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/1296/answer/1297>



## Заключение врача

Уважаемый Федор! Боли в области послеоперационной раны могут быть объяснены ранним послеоперационным периодом (3 недели – это маленький срок), физической нагрузкой (при половом акте). Вам необходимо наблюдать – не увеличивается ли (за счет отека) мошонка с оперированной стороны, есть ли гиперемия (покраснение), местное повышение температуры. Это признаки воспаления. Также пока Вам надо ограничить половую активность, тяжелую физическую нагрузку, переохлаждение, перегревание. Если боли будут сохраняться через 1,5-2 месяца, то тогда необходимо будет обследоваться: сделать УЗИ мочевого пузыря, предстательной железы с определением количества остаточной мочи, органов мошонки. Возможно, боли сочетанного характера, т. е. сочетаются с болями, обусловленными воспалительным процессом в предстательной железе (простатитом). Пишите, если будут вопросы. Буду рад помочь.