

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Федор

Возраст: 21

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 15.12.2003 12:00:00

формирования заключения врача: 15.12.2003 12:00:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/1296/answer/1297>



Заключение врача

Уважаемый Федор! Боли в области послеоперационной раны могут быть объяснены ранним послеоперационным периодом (3 недели – это маленький срок), физической нагрузкой (при половом акте). Вам необходимо наблюдать – не увеличивается ли (за счет отека) мошонка с оперированной стороны, есть ли гиперемия (покраснение), местное повышение температуры. Это признаки воспаления. Также пока Вам надо ограничить половую активность, тяжелую физическую нагрузку, переохлаждение, перегревание. Если боли будут сохраняться через 1,5-2 месяца, то тогда необходимо будет обследоваться: сделать УЗИ мочевого пузыря, предстательной железы с определением количества остаточной мочи, органов мошонки. Возможно, боли сочетанного характера, т. е. сочетаются с болями, обусловленными воспалительным процессом в предстательной железе (простатитом). Пишите, если будут вопросы. Буду рад помочь.