

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Владимир

**Возраст:** 19

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 29.11.2005 14:31:26

**формирования заключения врача:** 01.12.2005 20:43:54

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/13066/answer/13067>



## Заключение врача

Уважаемый Владимир! Никаких особых эффективных методов по профилактике снижения функции гипоплазированной почки нет. При односторонней гипоплазии почки больные нуждаются в лечении только при осложнении этой аномалии пиелонефритом. Показания к операции нефрэктомии (удаление почки): прогрессирующий пиелонефрит, не поддающийся лечению; прогрессирующая артериальная гипертензия (злокачественная, т. е. также не поддающаяся коррекции); различные гнойные осложнения (например, гнойное расплавление камня почки). При таких состояниях удалять почку надо обязательно, т. к. происходит иммунное воздействие на здоровую почку. Подводя итог, ещё раз: Вам необходимо выяснить - функционирует ли почка, если пиелонефрит - то серьезно пролечить. Если есть вышеназванные осложнения, то, скорее всего, почку надо удалять. Ваш уролог располагает такими данными, которыми невозможно располагать при виртуальной консультации - осмотр, результаты всевозможных исследований (моча, УЗИ и т.д.), возможно, что всё взвесив, он принял решение о необходимости операции. Если все-таки придется оперироваться, то сейчас существуют лапароскопические методы операций при гипоплазии почки - это и меньшая травматичность, и хороший косметический эффект. Вам необходимо вместе с лечащим урологом все взвесить и прийти к общему согласию и тактике. Выздоровливайте.