

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Антон

**Возраст:** 19

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 30.11.2005 16:04:45

**формирования заключения врача:** 04.12.2005 11:05:49

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/13092/answer/13093>



## Заключение врача

Уважаемый Антон! Заочно такие вопросы не решаются. В Вашем случае этот вопрос необходимо решать совместно урологу и неврологу (характер травмы, уровень повреждения, характер нарушений сейчас – мочеиспускание, функция кишечника, наличие или отсутствие эрекции, и т. д.). Постоянные инъекции в кавернозные тела полового члена (в частности, папаверина) делать нельзя – это чревато развитием очагов фиброзных изменений в местах инъекций, что ведет к искривлению полового члена. Для более точной диагностики Вашего состояния необходимо сделать кавернозометрию, УЗИ-доплер сосудов полового члена, регистрацию спонтанных ночных эрекций. Потом после получения результатов можно будет принять решение о способах лечения. С уважением.