

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Елена

**Возраст:** 39

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 16.02.2010 17:55:00

**формирования заключения врача:** 19.02.2010 13:39:00

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/132398/answer/132399>



## Заключение врача

Уважаемая Елена! В Вашей ситуации надо:

1. Обследовать полового партнера и Вас на ЗППП методом ПЦР. Если уреаплазмы будут положительными, то надо лечиться обоим, под прикрытием противогрибковых препаратов. Также необходимо сдать посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам. Все эти анализы надо сдавать не ранее, чем через 4 недели после последнего приема антибиотиков (если Вы их принимали).
2. Гинеколога не занимают лечением цистита!
3. Если все инфекции будут отрицательными и объективной причины цистита не будет найдено, показано выполнение цистоскопии с биопсией из подозрительных участков, КУДИ - комплексного уродинамического исследования.
4. Разумеется, все эти исследования Вам надо делать не самостоятельно и не по заочным советам, а по назначениям уролога, который будет Вами заниматься.

Удачи.