

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Наталья

Возраст: 19

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 10.12.2005 00:35:43

формирования заключения врача: 11.12.2005 22:30:52

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/13302/answer/13303>



Заключение врача

Уважаемая Наталья! Две недели – это очень маленький срок для оценки результатов. Боли могут сохраняться еще некоторое время, это нормальное явление в послеоперационном периоде. Облегчить состояние можно любыми обезболивающими средствами (анальгин, кеторол). Если боли будут достаточно сильны, не будут купироваться приемом обезболивающих средств, то в таком случае потребуются консультация уролога, который Вас оперировал. Рана заживет сама, надо только ежедневно делать перевязки. Бандаж необходимо носить либо специальный (можно приобрести в аптеке) на шнуровке, либо сшить самим из плотной хлопчатобумажной ткани. Он должен быть шириной как корсет, впереди на мелких крючках (или других застежках). Одевать его надо утром лежа, еще не вставая с постели. С уважением.