

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Вера

**Возраст:** 18

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 14.12.2005 05:58:08

**формирования заключения врача:** 14.12.2005 21:42:24

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/13392/answer/13393>



## Заключение врача

Уважаемая Вера! В случае нарушения функции тазовых органов оптимальным вариантом является установление эпицистостомы. Обычно своим пациентам я рекомендую следующую тактику ухода за дренажами. Вас выписали из стационара с дренажной трубкой (цистостомой), которая находится в мочевом пузыре. Этот дренаж требует особого ухода, так как нарушение правил ухода может привести к закупорке дренажа или развитию воспалительного процесса. Необходимо выполнять следующие правила ухода за дренажом: 1. Проводить промывание дренажа 1-2 раза в сутки 2. Проводить смену повязки не реже 1 раза в день, а при загрязнении и чаще. Как проводить промывание дренажа в домашних условиях? Для этого потребуется: шприц Жане (продается в аптеках), раствор фурацилина, лоток, 70-процентный спирт. Как приготовить шприц Жане к использованию? Необходимо прокипятить шприц в течение 30 минут с момента закипания. Обработка шприца проводится перед каждым промыванием. После использования шприц тщательно промывается под проточной водой. Как приготовить раствор фурацилина? Готовый раствор фурацилина продается в аптеках. Если готового раствора нет, то можно приготовить фурацилин в домашних условиях. Для этого в аптеке необходимо приобрести фурацилин в таблетках. Перед промыванием надо залить 5 таблеток фурацилина 250 мл теплой кипяченой воды и дать таблеткам раствориться. На каждое промывание используйте 150-200 мл раствора. Раствор для промывания должен быть теплым. Как проводить промывание: - перед промыванием дренажа необходимо приготовить все необходимое, - тщательно вымыть руки, - набрать в шприц раствор фурацилина, - отсоединить удлинитель дренажа, - обработать спиртом конец дренажной трубки, - медленно ввести 30-50 мл фурацилина, затем отсоединить шприц для того, чтобы введенный фурацилин вышел и мочевого пузыря, - повторить процедуру, - оставшимся фурацилином промыть удлинитель дренажа, - обработать конец дренажной трубки и удлинитель спиртом и соединить их. Внимание! Если во время промывания появились боли, в моче появилась кровь или раствор вводится с трудом, а выделяется не из дренажа, а из раны, необходимо обратиться к врачу! Если произошло выпадение цистостомы, необходимо срочно обратиться к врачу или вызвать скорую помощь! Как проводится смена повязки. Для этого потребуется: стерильный бинт, лейкопластырь, ножницы, спирт. Как поменять повязку: - приготовить все необходимое, - тщательно вымыть руки, - снять старую повязку, - обработать кожу вокруг дренажной трубки спиртом, - наложить новую повязку из стерильного бинта, - зафиксировать повязку лейкопластырем. Внимание! Если вокруг дренажной трубки появилась краснота, отек, гнойное отделяемое, обратитесь к врачу! С уважением.