

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Львов Аркадий

**Возраст:** 18

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 14.12.2005 11:50:55

**формирования заключения врача:** 14.12.2005 21:43:35

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/13402/answer/13403>



## Заключение врача

Уважаемый Аркадий! Сморщивание почки не приводит к повышению креатинина, если вторая почка справляется с двойной нагрузкой. Такое повышение креатинина, вероятнее всего, связано со снижением функции и второй почки. На УЗИ можно увидеть только сморщивание (уменьшение размеров, истончение паренхимы и т. д.). Для оценки функции почек необходимо сделать радиозотопное исследование почек. Пока, к сожалению, Вам необходимо непрерывно принимать такие препараты, как леспенефрил, леспефлан. При дальнейшем повышении креатинина показаны экстракорпоральные методы очистки крови (диализ). При повышенном давлении (170/95) баня и сауна категорически противопоказаны. С уважением.